

Evaluation du risque de mésusage des antalgiques opioïdes (Opioid risk tool)

Appréciation du risque relié aux analgésiques opiacés			
		Femme	Homme
1) Antécédent familial d'abus d'une substance	Alcool	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3
	Drogues illicites	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
	Autre	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
2) Antécédent personnel d'abus d'une substance	Alcool	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
	Drogues illicites	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
	Médicaments d'ordonnance	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
3) Âge (sujets de 16 à 45 ans)		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
4) Antécédent de violence sexuelle pendant l'enfance		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0
5) Trouble psychologique	Trouble de l'attention, trouble bipolaire, trouble obsessionnel compulsif, schizophrénie	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
	Dépression	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
Cotation : Faible (0 à 3), Modéré (4 à 7), Elevé (8 +)			

Ce tableau permet d'évaluer le risque de mésusage en trois niveaux (faible, modéré, fort) selon 5 items et pondéré selon le sexe du patient.